

Videoendoscopia Digestiva Alta

- Jejum absoluto de 12 horas
- Não ingerir medicamentos anti-inflamatórios, anticoagulantes ou aspirina 5 dias antes da data do exame
- Comparecer acompanhado(a).

Ultrassonografia

- Jejum absoluto de 12 horas
- Chegar na clínica com uma hora de antecedência e ingerir água, caso seja ultrassonografia de abdômen total.

Videocolonosopia

- Não ingerir medicamentos anti-inflamatórios, anticoagulantes ou aspirina 5 dias antes da data do exame
- Comparecer acompanhado
- Dieta sem resíduos na noite de véspera do exame. Ingerir somente líquidos de cor clara e bolachas de água e sal.
- Dieta líquida de cor clara no dia do exame
- Iniciar o preparo na véspera do exame, ingerindo quatro comprimidos de Dulcolax às 18 horas.
- Completar o preparo no dia seguinte (na data do exame), ingerindo a seguinte solução oral: 750 ml de manitol 20%, diluído em 750 ml de suco claro coado ou água de coco.
- Tomar 01 comprimido de plasil ou dramin às 07 horas.
- Tomar 01 copo da solução de manitol a cada 15 minutos a partir das 08:00 horas. Ingerir toda a solução.
- Em caso de cólicas, ingerir 40 gotas de Buscopam simples.
- Manter somente dieta líquida até o momento do exame (isotônicos claros, água de côco, chá claro com açúcar, água)
- Mantenha-se hidratado, evitando assim a hipotensão que se manifesta através de fraqueza e tontura.
- Dúvidas e auxílios, entre em contato com o seu médico, através do telefone da Clínica Hygeia.

Retossigmoidoscopia

- 2 frascos de fosfo enema (Fleet enema) via retal 2 horas antes do exame, a cada 30 minutos.